




ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
И ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ

ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата Фироко®



(Организация-разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных»,
Россия, 140050, Московская область, городской округ Люберцы,
дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом 3А, офис 34)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-28.23-5079№ПВР-3-28.23/03894

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фироко® (Firoco).
Международное непатентованное наименование: фирококсиб.
2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.
Фироко® в качестве действующего вещества содержит фирококсиб – 57 мг или 227 мг в таблетке, а также вспомогательные вещества: Лудипресс (лактоза моногидрат – 93%, Коллидон 30 – 3,5%, Коллидон CL – 3,5%), кальция стеарат, ароматизатор «Бекон».
3. По внешнему виду Фироко® представляет собой плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета (допускается наличие вкраплений другого оттенка) с риской на одной стороне и логотипом VIC на другой.
Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения и транспортирования – 2 года со дня производства.
Запрещается применять препарат по истечении срока годности.
4. Фироко® в дозировке 57 мг и 227 мг упаковывают по 4 таблетки в блистеры из пленки полиэтиленовой и металлизированной фольги, которые по 2 или 5 штук упаковывают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности не выше 60%.
6. Фироко® следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Фироко® относится к лекарственным препаратам фармакотерапевтической группы нестероидных противовоспалительных средств.
10. Фирококсиб является селективным ингибитором циклооксигеназы-2 (COX-2), избирательно нарушает образование простагландинов, участвующих в формировании воспалительной реакции, подавляет экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Действует преимущественно в очаге воспаления и практически не влияет на продукцию простагландинов, регулирующих почечный кровоток и целостность слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Оказывает болеутоляющее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.
После перорального введения собакам в рекомендованной дозе фирококсиб быстро всасывается, максимальная концентрация в крови достигается через 1,25 часа. Период полувыведения составляет 8 часов. Фирококсиб практически полностью связывается с белками крови, метаболизируется в печени, выводится с желчью через кишечник.
Фироко® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующего, тератогенного и эмбриотоксического действия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Фироко® назначают собакам в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и жаропонижающего средства при лечении остеоартрозов, а также после ортопедических, стоматологических операций и операций на мягких тканях.
12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).
Запрещается применять препарат собакам с массой менее 3 кг, а также животным с желудочно-кишечными кровотечениями, патологией крови, геморрагическом синдроме, почечной и печеночной недостаточности.
Следует избегать применения животным с признаками обезвоживания, гиповолемии или гипотензии, так как существует потенциальный риск повышенной почечной токсичности.
13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки с мылом. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды.
Упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).
14. Не рекомендуется применение препарата сукам в период беременности и лактации, а также щенкам до 10-недельного возраста.
15. Фироко® применяют собакам индивидуально перорально один раз в сутки в дозе 5 мг фирококсиба на 1 кг массы животного в соответствие с таблицей:

Масса собаки (кг)	Количество таблеток на 1 прием	
	Фироко® 57 мг	Фироко® 227 мг
3-5,5	½	
5,6-7,5	¾	
7,6-10	1	¼
10,1-13	1¼	
13,1-16	1½	
16,1-18,5	1¾	
18,6-22,5	2	½
22,6-34		¾
34,1-45		1
45,1-56		1¼
56,1-68		1½
68,1-79		1¾
79,1-90		2

Продолжительность курса лечения при остеоартрозах зависит от состояния животного и определяется лечащим ветеринарным врачом. Применение препарата более 90 дней следует проводить под регулярным контролем ветеринарного врача. Для облегчения послеоперационных болей и воспаления при операциях на мягких тканях, ортопедических и стоматологических операциях препарат применяют за 2 часа до начала операции, а затем по необходимости 1 раз в сутки, в течение 2-3 суток.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. Редко у животных возможно раздражение слизистой оболочки желудка, рвота и диарея, в исключительных случаях – нарушения в деятельности центральной нервной системы. В случае появления таких симптомов, как рвота, повторяющаяся диарея, скрытая кровь в кале, резкое снижение массы тела, отказ от приема корма, вялость, судороги, аллергические реакции, изменение биохимических показателей почек и печени, прием препарата следует немедленно прекратить и обратиться к ветеринарному врачу. В очень редких случаях у собак, получавших рекомендованную лечебную дозу, отмечались нарушения функции печени и/или почек.
17. При передозировке препарата у животных может наблюдаться избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта, угнетенное состояние.
18. Фироко® не следует применять одновременно с другими нестероидными противовоспалительными средствами и глюкокортикостероидами. Язвы желудочно-кишечного тракта могут усугубляться кортикостероидами у животных, получающих нестероидные противовоспалительные препараты. Сопутствующее лечение лекарственными средствами, оказывающими влияние на почечный кровоток, например, диуретиками или ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), должно проводиться под контролем ветеринарного врача. Препарат не следует назначать одновременно с потенциально нефротоксическими веществами. Одновременное применение других активных веществ, обладающих высокой степенью связывания с белками, может конкурировать с фирококсимом за связывание и, таким образом, приводить к токсическим эффектам. 19. Особенностей действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.
20. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.
21. Фироко® не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «НПФ ВИК», Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт. Северный, ул. Березовая, д. 3 (полный производственный цикл)

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140050, Московская обл., г.о. Люберцы, дачный пос. Красково, Егорьевское ш., д. 3А, офис 34