

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ  
29 АВГ 2018

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата *Аэрозоль Больфо®*

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH»  
*Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия*)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-6, 14-2125 НПВЧ-3-0, 2/01186

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Аэрозоль Больфо® (Bolfo® Spray).

Международное непатентованное наименование: пропоксур.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения в аэрозольной упаковке.

Аэрозоль Больфо® в качестве действующего вещества в 100 г содержит пропоксур – 0,25 г и вспомогательные вещества: ароматическую добавку, лимонную кислоту обезвоженную, изопропанол, сжатые газы - пропан и бутан.

3. По внешнему виду лекарственный препарат Аэрозоль Больфо® представляет собой прозрачную жидкость от желтого до светло-коричневого цвета. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 5 лет со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата Аэрозоль Больфо® по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат Аэрозоль Больфо® расфасованным по 250 мл в металлических флаконах с распылительными головками и защитными колпачками. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат Аэрозоль Больфо® в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 0°C до 30°C.

6. Аэрозоль Больфо® следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Аэрозоль Больфо® относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам.

10. Пропоксур (2-изопропоксифенил-N-метилкарбамат), входящий в состав препарата, попадая на кожно-волосяной покров животного, оказывает длительное инсектоакарицидное действие на блох и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Пропоксур активный ингибитор эстеразных систем организма членистооногих, стимулирует гликолиз и тормозит окислительное фосфорилирование, что приводит к нарушению биохимических процессов, параличу и гибели эктопаразитов.

Аэрозоль Больфо® по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании на слизистые оболочки вызывает слабое раздражение. Токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

## III. Порядок применения

11. Аэрозоль Больфо® применяют для обработки собак и кошек при энтомозах и поражении иксодовыми клещами.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата Аэрозоль Больфо® является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Не следует обрабатывать препаратом Аэрозоль Больфо® больных инфекционными болезнями и выздоравливающих животных, а также щенков и котят до 3-месячного возраста.

13. При работе с препаратом Аэрозоль Больфо® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами, пользоваться резиновыми перчатками и респиратором (марлевой повязкой).

Во время работы с лекарственным препаратом Аэрозоль Больфо® не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Аэрозоль Больфо®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Применение беременным и кормящим животным возможно после консультации с ветеринарным врачом.

15. Перед использованием флакон с препаратом встряхивают и, нажимая на распылительную головку в течение нескольких секунд, распыляют Аэрозоль Больфо® с расстояния 30-40 см на туловище животного против роста волос, слегка увлажняя шерсть. Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и грудь, затем кончиками пальцев (в перчатке) препарат наносят на шерсть вокруг глаз и носа, после чего опрыскивают шею, туловище, конечности и хвост.

Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках), вдали от открытого огня и нагревательных приборов, предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами.

Для предотвращения слизывания препарата животному надевают намордник или шейный воротник, которые снимают после полного высыхания кожно-волосяного покрова.

В целях предотвращения выплода блох и повторной инфestationи животного, подстилки, попоны и другие предметы ухода обрабатывают препаратом Аэрозоль Больфо® из расчета четыре кратковременных нажатия на распылительную головку на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности и через 1-2 часа очищают пылесосом.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в неделю.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата Аэрозоль Больфо® в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях при повышенной индивидуальной чувствительности животного к препарату (избыточное слюноотделение, слезотечение) или появлении признаков раздражения кожи препарат следует смыть водой с мылом, а при необходимости обратиться к ветеринарному врачу.

17. При передозировке препарата у некоторых собак могут наблюдаться повышенная саливация, сужение зрачков, рвота, диарея. В этом случае животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

18. Не следует применять лекарственный препарат Аэрозоль Больфо® одновременно с другими инсектоакарицидными лекарственными препаратами для обработки животных.

19. Особеностей действия лекарственного препарата при первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. При пропуске очередной обработки, применение препарата возобновляют, в той же дозе по той же схеме.

21. Лекарственный препарат Аэрозоль Больфо® не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany).

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО “БАЙЕР”  
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул.,  
18, стр. 2;  
тел. (495) 234-2000

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Аэрозоль Больфо®, утвержденная Россельхознадзором 22.09.2015 года.