

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины Биокан<sup>®</sup> Puppy для профилактики чумы и парвовирусной инфекции собак.

(организация - разработчик: АО Биовета, Чешская Республика)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: вакцина Биокан<sup>®</sup> Puppy (Biocan<sup>®</sup> Puppy).

Международное непатентованное наименование: вакцина для профилактики чумы и парвовирусной инфекции собак.

2. Лекарственная форма: сухой компонент (Биокан<sup>®</sup> Puppy D) - лиофилизированная масса и жидкий компонент (Биокан<sup>®</sup> Puppy P) - суспензия для инъекций.

Сухой компонент изготовлен из аттенуированного вируса чумы плотоядных (штамм CDVU 39), культивированного на клеточной линии VERO, с добавлением вспомогательных веществ (трометамол, хелатои, сахара, декстроза) 30%.

Жидкий компонент изготовлен из инактивированного парвовируса (штамм CPV OP), с добавлением вспомогательного вещества: гидрат окиси алюминия 10%.

Сухой компонент по внешнему виду представляет собой сухую пористую массу кремового или розового цвета, жидкий компонент – жидкость розово-красного цвета с осадком, при взбалтывании легко разбивающимся в гомогенную звезду.

Вакцина расфасована по 1,0 мл (одна иммунизирующая доза) в стеклянные флаконы соответствующей вместимости. Флаконы герметично укупорены резиновыми пробками, укреплены алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упакованы в пластиковые контейнеры по: 5 иммунизирующих доз (10 флаконов), 10 иммунизирующих доз (20 флаконов), 50 иммунизирующих доз (100 флаконов). В каждую коробку с вакциной вкладывают инструкцию по ее применению.

Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°C, отдельно от продуктов питания и кормов.

5. Вакцину следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также остатки вакцины, не использованные в течение 4 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут или обработки 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

## II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина Биокан® Puppy вызывает формирование иммунного ответа у собак к возбудителям чумы плотоядных и парвовирусной инфекции на 14-21 сутки после ревакцинации, который сохраняется не менее 12 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе содержится: не менее  $10^{4.2}$  TCID<sub>50</sub>/мл аттенуированного вируса чумы плотоядных, не менее 1024 НАУ/мл аттенуированного парвовируса.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина Биокан® Puppy предназначена для профилактики чумы и парвовирусной инфекции собак.

9. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных. За 10 дней до иммунизации следует провести профилактическую дегельминтизацию. Запрещается применение препарата беременным и лактирующим собакам.

10. Вакцинации подлежат собаки, начиная с 5 недельного возраста. Вакцину вводят подкожно в дозе 1 мл независимо от породы и массы животного. Первичную вакцинацию осуществляют в возрасте 5 недель, с последующей ревакцинацией через 2-3 недели. В дальнейшем животных вакцинируют 1 раз в год.

Непосредственно перед применением сухой и жидкий компоненты объединяют в одном флаконе. Вакцинацию проводят с соблюдением правил асептики и антисептики.

11. Симптомов проявления чумы и парвовирусной инфекции, или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Особеностей постvakцинальной реакции при первичной и повторных иммунизациях не установлено.

13. Следует избегать нарушения схемы (сроков) введения вакцины, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики чумы и парвовирусной инфекции. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

15. Вакцину Биокан® Puppy разрешается применять одновременно с другими иммунобиологическими препаратами производства компании Акционерное общество «БИОВЕТА», при условии их раздельного применения.

16. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины Биокан® Puppy не устанавливаются.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной Биокан® Purru следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть в спецодежде и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством чистой воды. В случае разлива вакцины контаминированные поверхности подлежат обработке 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина, инструменты подлежат обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут.

При случайном введении препарата человеку, место инъекции необходимо немедленно обработать 70% этиловым спиртом, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель: АО Биовета 683 23 Ивановице-на-Гане, ул. Коменского, 212, Чешская Республика; тел.: 420 517 318 500, факс: 420 517 318 653, адрес электронной почты: comm@bioveta.cz.

Адрес места производства: АО Биовета 683 23 Ивановице-на-Гане, ул. Коменского, 212, Чешская Республика; тел.: 420 517 318 500, факс: 420 517 318 653, адрес электронной почты: comm@bioveta.cz.

Инструкция разработана ООО «Торговый Дом «Биопром-Центр», 105120, г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9, Тел/факс (495)7394217 / (495)7394217; совместно АО Биовета, 683 23 Ивановице-на-Гане, ул. Коменского, 212, Чешская Республика; тел. 420 517 318 500, факс: 420 517 318 653, адрес электронной почты: comm@bioveta.cz.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению вакцины Биокан® Purru, утвержденная Россельхознадзором 28 января 2009 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНИИ».

Номер регистрационного удостоверения