

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ВЛАСОВ Н.А.
12 АПР 2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп-цистита® Био для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак

(организация-производитель: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, г. Балашиха)

I. Общие сведения

1. Стоп-цистит® Био (Stop-cistit Bio) – кормовая добавка для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак.

2. Стоп-цистит® Био в качестве действующих веществ в 1 мл содержит сухие экстракты трав: горца птичьего – 5,0 мг, хвоща полевого – 5,0 мг, листьев крапивы – 5,0 мг, листьев брусники – 5,0 мг, листьев березы – 5,0 мг, корней солодки – 5,0 мг, плауна булавовидного – 5,0 мг, барбариса обыкновенного – 5,0 мг, золотарника канадского – 5,0 мг, а также вспомогательные компоненты: глицерин – 280 мг, натрия бензоат – 1,5 мг, сорбат калия – 1,5 мг и воду очищенную до 1 мл. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин не менее 0,04%, содержание суммы дубильных веществ в пересчете на танин не менее 0,4%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой суспензию от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.

4. Выпускают Стоп - цистит® Био расфасованным по 30, 50, 100 и 150 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости с навинчиваемыми пластмассовыми крышками. Флаконы упаковывают поштучно в картонную пачку вместе с инструкцией по применению и шприцем-дозатором.

Каждый флакон маркируют с указанием: наименования организации-производителя; наименования, назначения и способа применения кормовой добавки; состава; формы выпуска, объема во флаконе; номера серии; срока и условий хранения; даты производства; надписи «Для животных»; надписи «Перед применением флакон с суспензией тщательно встряхнуть».

На вторичную упаковку наносят маркировку с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; названия, назначения и способа применения добавки; состава; объема кормовой добавки во флаконе; формы выпуска; номера серии; номера регистрационного удостоверения; срока и условий хранения; даты производства; информации о подтверждении соответствия; номера СТО, условий отпуска; знака соответствия; штриховый код; знака «Не является лекарственным средством», надписей «Для животных», «Перед применением флакон

с суспензией тщательно встряхнуть», «Хранить в местах, недоступных для детей»; «Не применять по истечении срока годности»; «Перед применением ознакомиться с инструкцией».

Хранят добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. Стоп-цистит® Био не должен применяться по истечении срока годности.

II. Биологические свойства

5. Стоп-цистит® Био, благодаря комплексу биологически активных веществ, содержащихся в экстрактах растений, обладает антисептическим, мочегонным, спазмолитическим, диуретическим свойствами и салуретическим действием, снижает вероятность образования камней в почках и мочевых путях, способствует растворению и выведению конкрементов при мочекаменной болезни.

6. Экстракты крапивы, солодки, брусники, барбариса оказывают мочегонное, спазмолитическое действие, способствуют уменьшению камнеобразования в почках и мочевом пузыре. Трава горца птичьего, экстракт листьев березы и хвоща полевого повышают диурез, выводят с мочой избыток ионов натрия и хлора, препятствуя образованию мочевых камней. Плаун булавовидный и золотарник канадский обладают антисептическими и диуретическими свойствами.

Применение Стоп-цистита® Био животным снижает вероятность образования камней и способствует их растворению и выведению из мочевых путей и мочевого пузыря, снижению болевого синдрома при мочекаменной болезни и более быстрому восстановлению работы мочевыделительной системы.

III. Порядок применения

7. Стоп-цистит® Био применяют кошкам и собакам для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы, а также в комплексе с лекарственными препаратами при урологическом синдроме, мочекаменной болезни и в послеоперационный период после удаления мочевых камней.

8. Применяют животным индивидуально с кормом или вводят непосредственно на корень языка с помощью шприца-дозатора 2 раза в сутки, в течение 10 - 14 дней, в следующих дозах:

Вид и масса животного		Доза, мл/животное	
		суточная	разовая
кошки	до 5 кг	4,0	2,0
	от 5 кг	6,0	3,0
собаки	до 10 кг	4,0	2,0
	от 10 до 20 кг	6,0	2,0-3,0
	от 20 до 30 кг	8,0	3,0-4,0
	от 30 до 40 кг	12,0	4,0-6,0
	свыше 40 кг	16,0	6,0-8,0

Перед использованием флакон с кормовой добавкой следует тщательно встряхнуть в течение 1-2 минут.

9. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам кормовой добавки и появлении аллергических реакций использование кормовой добавки следует прекратить.

10. Стоп-цистит® Био совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

11. Противопоказаний для применения кормовой добавки не выявлено.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе со Стоп-циститом® Био следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «АПИ-САН», г. Москва.

Организация-производитель: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Стоп-цистита® Био, утвержденная Россельхознадзором 13 декабря 2013 года.

Регистрационный номер ПВР-2-33.13/02976